

BROCUM granule

Rodenticid – nástraha proti myším, potkanům, hrabošům a hryzcům v domácnostech a sféře komunálních služeb.

Přípravek má antikoagulační účinek. Jedinec, který přípravek zkonsumoval, hyne na následky vnitřního krvácení. Působí pomalu, bezbolestně a nezpůsobuje zpozorování otravy v kolonii hlodavců. Je nejúčinnější ze všech antikoagulantů. Granulovaná forma zvyšuje atraktivnost přípravku vzhledem k přirozené vlastnosti hlodavců ke hryzání a zároveň omezuje prašnost, čím se stává přípravek bezpečnější.

Složení: 100 g přípravku obsahuje:

Brodifacoum 0,005 g (EC 259-980-5)
Obilniny, pojiva, chuťové a atraktivní látky doplněné do 100 g. (99,995)

Zabraňte ohrožení člověka a životního prostředí, postupujte podle návodu na použití.

Návod na použití: nástrahu pokládejte na hromádky 25 – 50 g na místa nejčastěji navštěvovaná hlodavci (obydlí, zahrady, sklady, smetiště a pod.). Odběr nástrahy sledujte a doplňujte ji až do úplného vyhubení nežádoucích hlodavců. Při kladení nástrahy vždy používejte gumové rukavice. Přípravek pokládejte na podložky a případně i vhodně maskujte. Nejvhodnější a nejbezpečnější způsob je umístování do monitorovacích a jedových staniček. Při manipulaci se vyhnout vzniku prachu – pytle s přípravkem nezatěžovat, nesypat z výšky, opatrně postupovat při vyprazdňování posledních zbytků v pytli. Nepracujte v místech velkého proudění vzduchu a proti větru.

Upozornění: **S2** Uchovávejte mimo dosah dětí. **S20** Nejezte ani nepijte při používání. **S21** Nekuřte při používání. **S22** Nevdechujte prach. **S36** Používejte vhodný ochranný oděv. **S37** Používejte vhodné ochranné rukavice. **S39** Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. **S46** Při požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc:

při nadýchání: vyvést postiženého na čerstvý vzduch a konzultovat s lékařem;

při kontaktu s pokožkou: odstranit znečištěný oděv a pokožku umyjte větším množstvím vody a mýdla. Zasažené místo pozorovat po dobu 24 hodin. V případě příznaků konzultovat s kožním lékařem;

při kontaktu s očima: oči vyplachujte při otevřených víčkách minimálně 15 minut velkým množstvím čisté tekoucí vody. Konzultujte s lékařem;

při požití: nevyvolávat zvracení, aby se nezvýšilo riziko vnitřního krvácení. Podat absorpční uhlí v dávce 25 – 100 mg a ihned konzultovat s lékařem.

Informace pro lékaře: brodifacoum je antikoagulant, který blokuje činnost protrombínu a je inhibátorem vitamínu K. příznaky otravy jsou podkožní krvácení a krvácení ze sliznic. Specifické antidotum – vitamín K.

Léčení postiženého je možné konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem v Praze, tel. 224 91 92 93.**

Skladování: Skladujte v neporušených původních obalech, na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, krmiv, nápojů, léků a obalů pro ně určených. Taktéž skladovat odděleně od desinfekčních prostředků, hnojiv a chemikálií, aby nástraha nepohltila jejich pach a stala se nedůvěryhodnou pro hlodavce.

Likvidace obalů: Obal zneškodněte spálením ve schválené spalovně

Výrobce: Colkim s.r.l ., Ozzano Emilia (neboť), Italy

Distributor: SLOM s.r. o. , Zálešná IV/1177 Zlín 760 01

Telefon : +420577431128 , **Fax :** +420577218701 , **E-mail** slom@slom.cz

Hmotnost: 20 kg pytel

Doba použitelnosti: do 18 měsíců od data výroby

Datum výroby: uvedený na obale

Číslo šarže: uvedené na obale

Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., Č.j. REG – 33.7.1. – 18. 1. 07 / 2337

Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 49/2007 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno.