

**BROCUM**  
sáčky  
**Rodenticid ve formě těstovinových sáčků**

**Nástraha na ničení potkana a myši domácí v domácnostech a komunální oblasti.**

Přípravek se řadí mezi antikoagulanty. Zabraňuje srážení krve při bezbolestném, hlavně vnitřním krvácení, bez upadnutí zvířete do agónie. Výhodou této hotové, požerové nástrahy je, že působí pomalu, v průběhu několika dnů. To umožňuje, že otrávení jedinci nevzbudí podezření u ostatních členů kolonie, čím nevzniká nedůvěra vůči této nástraze.

**Složení:** 100 g přípravku obsahuje:

0,005 g Brodifacoum (čistý) ( EC 259-980-5 )

99,995 g sroty obilnin, rostlinný olej, ochucovadla a atraktanty.

**Zabraňte ohrožení člověka a životního prostředí, postupujte podle návodu na použití.**

**Návod na použití:** Hotové nástrahy bez jakékoliv úpravy se kladou na místa výskytu hlodavců v množství a vzdálenosti, které jsou závislé od druhu a početnosti výskytu těchto nežádoucích jedinců. Na kladení použijte z bezpečnostních důvodů nepropustné podnosy. Zabráníte tím znečištění prostředí olejem, který částečně váže účinnou látku. Aby nedocházelo k ohrožení člověka a necílených živočichů, je vhodné nástrahy maskovat např. deskami a křídlicemi. Vhodnější způsob je klást nástrahu do trubek a nebo bedniček s otvory. Nejvhodnější způsob je kladení do monitorovacích, jedových stanic. Při kladení nástrahy používejte ochranné rukavice.

**Upozornění: S2** Uchovávejte mimo dosah dětí. **S13** Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. **S20/21** Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. **S24** Zamezte styku s kůží. **S28** Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. **S37** Používejte vhodné ochranné rukavice. **S46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. **S61** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Seznamte se, se speciálními instrukcemi z bezpečnostního listu

**První pomoc:**

**při kontaktu s pokožkou:** odstranit znečištěný oděv a pokožku umyjte větším množstvím vody a mýdla. Zasažené místo pozorovat po dobu 24 hodin. V případě příznaků konzultovat s kožním lékařem;

**při kontaktu s očima:** oči vyplachujte při otevřených víčkách minimálně 15 minut velkým množstvím čisté tekoucí vody. Konzultujte s lékařem;

**při požití:** nevyvolávat zvracení, aby se nezvýšilo riziko vnitřního krvácení. Podat absorpční uhlí v dávce 25 – 100 mg a ihned konzultovat s lékařem.

**Informace pro lékaře:** brodifacoum je antikoagulant, který blokuje činnost protrombinu a je inhibitorem vitamínu K. příznaky otravy jsou podkožní krvácení a krvácení ze sliznic. Specifické antidotum – vitamín K.

Léčení postiženého je možné konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem v Praze, tel. 224 91 92 93**

**Skladování:** Skladujte v neporušených původních obalech, na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, krmiv, nápojů, léků a obalů. Také skladovat odděleně od desinfekčních prostředků a chemikálií, aby nástraha nepohltila jejich pach a stala se nedůvěryhodnou pro hlodavce.

**Likvidace obalů:** Obal zneškodněte spálením ve schválené spalovně.

**Výrobce:** Colkim s.r.l ., Ozzano Emilia (neboť), Italy

**Distributor:** SLOM s.r.o. , Zálešná IV/ 1177 Zlín 760 01

**Telefon :** +420577431128 , **Fax :** +420577218701 , **E-mail :** slom@slom.cz

**Hmotnost:** 20 kg

**Doba použitelnosti:** do 18 měsíců od data výroby

**Datum výroby:** uvedený na obale

**Číslo šarže:** uvedené na obale

**Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., Č.j. REG – 33. 7. 1. – 18. 1. 07 /2337**

**Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 50/2007 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno.**