

# ***ETIKETA VÝROBKU A NÁVOD K POUŽITÍ***

Požerová nástraha ve formě červeně zbarvených pelet k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, krysa, myš domácí a hryzec vodní v uzavřených objektech jako jsou chaty, kolny, bytové prostory, sklepy, půdy a jejich nejbližší okolí. Speciální úprava nástrahy ji předurčuje k použití i ve vlhkém prostředí. Nástraha má zvýšenou odolnost vůči plísním. Její výrazné aroma je pro hlodavce neodolatelné.

*Složení:* 0,005 % bromadiolone (tj.0,05 g v 1 kg)  
99,995 % atraktanty a pojidla

**Pozor! Jed na potkany, krysy, myši domácí!**  
**Obsahuje vysoce toxický antikoagulant bromadiolon!**

R 55: toxický pro živočichy  
S 2: uchovávejte mimo dosah dětí  
S 13: uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv  
S 20/21: nejezte, nepijte a nekuřte při práci  
S 26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
S 28: při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody  
S 37: používejte vhodné ochranné rukavice  
S 46: při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu

Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu použití!  
Nepokládejte na místa, kde by byl dosažitelný pro domácí nebo hospodářská zvířata!  
Nesmí být použit ve volné přírodě!

## ***Vlastnosti:***

Stopratox je antikoagulantní rodenticid druhé generace. Působí i na populace resistantní vůči antikoagulantům první generace. Působí na hlodavce smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky. Hlodavci je nástraha velmi dobře přijímána.

## ***Mechanismus účinku:***

Stopratox snižuje srážlivost krve u hlodavců a zvyšuje propustnost krevních cest, což vede k zevnímu i vnitřnímu krvácení a posléze k uhynutí.

## ***Dávkování a způsob použití:***

Nástraha se pokládá na místa největšího výskytu hlodavců, zejména do blízkosti východů z nor, k obvyklým zdrojům potravy a vody a podél přístupových stezek k nim. Nástrahy pokládat do jedových stanic.

Nástrahu je nutno doplňovat tak dlouho, pokud trvá její odběr. Nespoteřované zbytky nástrahy je nutné neškodně odstranit.

## ***Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:***

Při kladení používat vhodné ochranné rukavice. Při práci není dovoleno jíst, pít, kouřit. Po práci je nutno se umýt vodou a mýdlem.

***Příznaky otravy:***

Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice a krvácení z nosu a dásní.

***První pomoc:***

Při požití vypít asi půl litru vlažné vody s deseti tabletami medicínálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení. Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut proudem čisté vlažné vody. Pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem. Postiženého s informací o přípravku a o poskytnuté první pomoci předat k dalšímu ošetření lékaři.

Antidotem v případě otravy je vitamín K1, jehož dávku určí lékař. Léčbu postiženého je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93.

***Skladování:***

Stopratox se skladuje odděleně od potravin, nápojů, krmiv a chemických látek. Pachy z těchto látek mohou negativně ovlivnit přijímání nástrahy hlodavci. Prázdný obal od přípravku uložit do komunálního odpadu.

***Minimální doba použitelnosti:*** 24 měsíců od data výroby v původních neotevřených obalech

***Výrobce:*** MIKROP ČEBÍN a.s., Čebín 416, PSČ 664 23, tel./fax 549 410 318  
[www.mikrop.cz](http://www.mikrop.cz)

***Distribuce:*** SLOM, s.r.o., Zálešná IV/ 1177, Zlín 760 01  
Tel. 57 74311 28, FAX: 57 721 87 01, E-mail : [slom@slom.cz](mailto:slom@slom.cz), [www.slom.cz](http://www.slom.cz)

***Datum výroby:*** viz obal