

PESTSTOP® DELTA 5 CS

Charakteristika: Insekticidní přípravek obsahující pyrethroid deltamethrin v mikroenkapsulované suspensi (CS), určený k hubení rusů, švábů, štěnic, mravenců, blech, rybenek a much.

Učinná látka: deltamethrin 50g/l (5% w/w)

Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: DOPLNIT

Upozornění:



N - Nebezpečný pro životní prostředí



Xn – Zdraví škodlivý

Upozornění:



GHS07



GHS09

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití: Aplikujte ve formě hrubého postřiku, za použití ručního nebo elektrického postřikovače. Postřík aplikujte na všechna místa, kde se hmyz vyskytuje, zvláštní pozornost věnujte štěrbinám a prasklinám, skrytým místům, místům úkrytů a cestám hmyzu za potravou a vodou.

Před každým použitím přípravku k aplikaci, přípravek v plastické lahvi důkladně protřepejte. Po odebrání potřebného množství přípravku lahev ihned důkladně uzavřete.

Nádobu postřikovače naplňte do poloviny vodou. Přidejte potřebný objem přípravku **Peststop® Delta 5 CS**, doplňte nádobu postřikovače vodou na požadovaný objem, postřikovač uzavřete a směs důkladně promíchejte.

Při slabé infestaci a pro opakovaný postřík použijte 25 ml přípravku Peststop® Delta 5 CS

pro přípravu 5 litrů pracovní směsi

Při silné infestaci použijte 50 ml přípravku Peststop® Delta 5 CS pro přípravu 5 litrů pracovní směsi.

Proti rusům a švábům: Aplikujte postřik ve formě pásů kolem stěn místností, kolem prahů dveří a spodních rámců oken, dale pod nábytek a pod všechno vybavení místností, kuchyňská kamna, ledničky apod., stejně tak do všech štěrbin a škvír, kde se rusi a švábi mohou vyskytovat.

Proti blechám: Aplikujte postřik na celou plochu místností a na boční stěny do výše 1 metru. Pozornost věnujte zejména místům odpočinku koček, psů a dalších zvířat obývajících místnosti. Postřik však neaplikujte přímo na zvířata.

Průměrná spotřeba pracovní směsi je 5 litrů na 100 m² postřikem ošetřené plochy.

Opakovaný postřik: Pokud to je potřeba, postřik by měl být opakován každé 2 až 3 měsíce.

Proti mouchám naletujícím na potraviny (např. moucha domácí), nebo proti bodalkám:

Postřik je nutné aplikovat na všechna místa, na která mouchy sedají (uvnitř budov: na boční stěny, strop, sloupce, trámy, rámy oken a dveří apod.) ve výšce, kam nedosáhnou hospodářská a domácí zvířata.

Postřik proti létajícímu hmyzu by měl být opakován každé 4 měsíce.

Proti štěnicím: 50 ml přípravku Peststop® Delta 5 CS smíchejte s 5 litry vody. Přípravek aplikujte do konstrukcí postelí a lůžek po jejich demontáži, na podlahu a boční stěny kolem postelí a lůžek, do všech úkrytů, škvír, štěrbin, tj. do všech míst, kde se štěnice mohou přes den skrývat. Důležité je štěnice postřikem pokud možno přímo zasahnout. Postřik je nutné v případě potřeby dvakrát, třikrát i vícekrát opakovat v intervalech 2 až 3 dní. Postřikem by měly být vyhubeny všechny štěnice.

Během postřiku postřikovač opakovaně protřepejte a pracovní směs spotřebujte vždy v den její přípravy.

Na některých površích může přípravek zanechat slabé bělavé stopy, případné zanechávání stop je vhodné nejdříve ověřit.

Upozornění

Přípravek může být používán pouze jako prostředek proti hmyzu a pouze podle návodu k použití. Ošetřené místnosti mohou být použity znovu až po zaschnutí postřiků a odvětrání. Přípravek skladujte v originálních obalech, v uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah dětí a nepovolaných osob a domácích zvířat. Přípravek může být aplikován pouze na místa, která jsou mimo dosah dětí a hospodářských a domácích zvířat. Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Nevdechujte aerosol přípravku při aplikaci.

Označení rizik

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H332 Škodlivý při vdechování.

Preventivní opatření

P261 Zamezte vdechování aerosolu.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech.

- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte zbytky přípravku a kontaminovaný obal podle platných předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Preventivní opatření

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní list. Neohrožujte zdraví lidí ani životní prostředí, dodržujte návod k použití. Přípravek může být používán pouze pracovníky s potřebnou odbornou způsobilostí. Přípravkem nekontaminujte potraviny, jídelní přístroje a nádobí ani povrchy, s nimiž přicházejí do kontaktu potraviny, nápoje a pitná voda. Postřík neaplikujte na potraviny a nápoje. Neaplikujte na povrchy, na nichž jsou potraviny připravovány, konzumovány nebo podávány. Odstraňte nebo přikryjte všechna akvária před aplikací postříku. Kromě osob, které provádějí postřík, nesmí být v místnostech přítomny jiné osoby ani hospodářská a domácí zvířata. Neaplikujte přímo na oděv a povlečení lůžek. Popstřík neaplikujte přímo na elektrické přístroje, vypínače, rozvody elektrické sítě ani na pohyblivé části přístrojů.

Zbytky přípravku a jeho obaly musí být likvidovány jako nebezpečný odpad.

Nevylévejte do kanalizace.

Přípravek je nebezpečný pro včely.

Chraňte před mrazem.

Reziduální účinky

Proti lezoucímu hmyzu: 12 týdnů

Proti létajícímu hmyzu (mouchám): 4 týdny

První pomoc:

Všeobecné pokyny: V případě nehody nebo při nevolnosti ihned přivolejte lékaře. Zasažený, kontaminovaný oděv ihned svléknout.

Při nadechnutí: Postiženou osobu přemístěte z nebezpečné oblasti. Při bezvědomí uložte postiženého do klidové boční polohy a zajistěte lékařské ošetření. Zajistit přívod čerstvého vzduchu.

Při kontaminaci kůže: Ihned omývejte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, oční víčka držte otevřené a minimálně po dobu 10 minut vyplachujte čistou tekoucí vodou. Vyhledejte očního lékaře.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. Osobám v bezvědomí nepodávejte žádné tekutiny.

První pomoc i lékař léčení případných otrav může konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402

Skladovatelnost: 2 roky od data výroby, pokud je skladován v originálních obalech v suchém a v chladném prostředí při teplotě nad + 5⁰ C. Chaňte před mrazem. Datum výroby na obalu.

Balení: pastikové lahve, obsah 1 litr

Výroba: GAT Microencapsulation AG, Austria pro Babolna Bio Ltd, Maďarsko

Dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín
Tel. : 57 74311 28 , Fax : 57 721 87 01