

Etiketa
IMIDASECT ANTS
Gelová nástraha proti mravencům

Nástraha k přímému použití proti mravencům faraónům (*Monomorium pharaonis*), mravencům drnovým (*Tetramorium caespitum*), mravencům obecným (*Lasius niger*) a mravencům domácím (*Lasius emarginatus*)

Přípravek je určen pro profesionální a neprofesionální použití

Účinná látka: Imidacloprid 0,1g/kg (0.01%)

Vzhled přípravku: bezbarvý gel se slabým charakteristickým zápachem

Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR 21644/2013/SOZ

Upozornění: PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TUTO ETIKETU.

Dodržujte přesně návod k použití, bezpečnostní opatření a doporučené dávkování a všechny podmínky bezpečného používání. Přípravek používejte pouze k účelům, pro které je určen. Při používání gelu by měla být dodržována všechna pravidla bezpečnosti práce, za niž máte plnou zodpovědnost, s ohledem na všechny faktory a podmínky, v nichž je gel aplikován. Výrobce zodpovídá za kvalitu a účinnost přípravku jen v případě, že byl prodán v originálním balení, skladován a používán doporučeným způsobem .

Klasifikace: žádná

R-věty: žádné

S-věty:

S2: Uchovávejte z dosahu dětí

S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima

S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)

Mechanismus účinnosti: Účinná látka imidacloprid patří mezi nitroguanidiny a v těle hmyzu se váže na neurony. Tato vazba narušuje přenos nervových impulsů, což je pro zasažený hmyz smrtelné.

Mravenci jsou lákáni potravními atraktanty obsaženými v gelu. Dělnice donášejí gel do hnízd a distribují jej mezi ostatní příslušníky kolonie. Gel účinkuje pozřením i kontaktně na larvy i dospělé mravence.

Návod k použití

Ve vnitřních prostorách umíst'ujte gel ve formě kapek nebo tenkých linek na místa, kde se mravenci vyskytují, tj. do blízkosti cestiček mravenců, do blízkosti míst, kde vyhledávají potravu a vodu, do blízkosti míst, kde pronikají do místností, nebo do blízkosti vchodů do jejich hnízd. V místech, kde je jen podezření na výskyt mravenců, nebo kde se mravenci vyskytují zřídka, umíst'ete gel do vhodné insekticidní staničky.

Mimo vnitřní prostory umísťujte gel ve formě kapek nebo tenkých linek do hnízd mravenců, nebo na jejich cestičky jen v případě, že mravenci pronikají do vnitřního prostoru. V případě, že jde jen o podezření na výskyt a aktivitu mravenců, umístěte gel do insekticidních staniček, aby byl chráněn před deštěm a jinými vnějšími vlivy.

Kde je to možné, odstraňte všechny ostatní zdroje potravy mravenců, aby mravenci ochotněji gel konzumovali.

Účel použití:

Nástraha IMIDASECT ANTS je určena k použití v těchto podmínkách:

V obytných prostorech: zejména v kuchyních

V potravinářských provozovnách: výrobnách, kuchyních veřejného stravování, jatkách, skladech, prodejnách, restauracích apod.

Ve veřejných budovách: ve zdravotnických zařízeních, hotelích apod.

Dávkování:

Ve vnitřních prostorech:

Mravenec faraón a mravenec drnový: 1-2 kapky gelu na 1 m²

Mravenec obecný a mravenec domácí: 1 kapka gelu na 1 m jejich cestičky.

Aplikované kapky gelu by měly mít asi 1 cm v průměru (přibližně 0,2 g).

Ve venovním prostoru:

Používejte pouze proti mravencům, kteří pronikají do vnitřního prostoru.

Mravenec obecný a mravenec domácí: 1 kapka gelu do blízkosti vchodu do hnízda nebo do blízkosti cestičky mravenců. Aplikovaná kapka by měla mít průměr asi 1 cm (asi 0,2g).

Poznámky:

Neaplikujte na místa, která jsou pravidelně uklizena a při úklidu by mohl být gel přemístěn na místa, kde by mohl přijít do kontaktu s potravinami, nebo zničen.

Neaplikujte na místa, která jsou pravidelně omývána vodou, protože voda gel poškodí.

Neaplikujte gel na místa čerstvě ošetřená postřikem insekticidy.

Aplikovaný gel nepostřikujte žádnými insekticidy.

Gel může poškozovat barvu textilních tkanin.

Bezpečnostní opatření

Po práci s přípravkem IMIDASECT ANTS a před jídlem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Neaplikujte do blízkosti nebalených potravin.

Neaplikujte gel na povrchy na nichž jsou potraviny skladovány, připravovány nebo konzumovány. Během aplikace chraňte potraviny, nádobí a jídelní přístroje před kontaminací gelem. Neaplikujte gel na místa přístupná dětem a domácím zvířatům.

Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, vodních toků.

První pomoc:

Kontaminovaný oděv ihned svlékněte.

Při kontaminaci kůže umyjte ihned velkým množstvím vody a mýdla.

Při zasažení oka/očí vypláchněte ihned vodou a kontaktujte lékaře.

Při náhodném polknutí vyhledejte ihned lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

Skladování

Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40 °C.

Chraňte před mrazem.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku

Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Balení: *(complete package size)*

Číslo šarže a datum výroby: viz obal.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

Výrobce: SHARDA Europe b.v.b.a.

Heedstraat, 58

1730 Asse – BELGIQUE

Dovozce a distributor v ČR: *(complete name and address of distributor in Czech Republic)*