

PROTECT[®] Sewer Block[®]

požerová nástraha k přímému použití na hubení potkanů, určená do vlhkého prostředí ve formě lisovaného bloku v parafínovém obalu.

Biocidní přípravek používejte bezpečně!

Použití:

K hubení potkanů (*Rattus norvegicus*) uvnitř objektů a v jejich okolí: v chovech domácích a hospodářských zvířat, v hospodářských budovách, v kanalizační síti, na skládkách komunálního odpadu apod. Přípravek je určen jen pro profesionální použití. Přípravek je opatřen závěsným očkem pro kotvení. Bloky PROTECT[®] Sewer Block jsou obaleny atraktivním parafínovým obalem, který umožňuje jejich účinné použití i ve vlhkých prostorách a v nepříznivých klimatických podmínkách. Přípravek je účinný i na potkany rezistentní k warfarínu.

PROTECT[®] Sewer Block je formulován k přímému použití bez dalších úprav. Přípravek pokládejte do deratizačních staniček odolných k neoprávněnému otevření, které umístíte mimo dosah dětí a necílových organismů. Deratizační staničky rozmístíte ve vzdálenosti 5-10 m od sebe na místa výskytu potkanů, na místa, kde potkani vyhledávají potravu a kolem jejich cestíček.

Dávkování:

75-225 g do jedné deratizační staničky (viz tabulka)

Vždy zvažujte stupeň zamoření v dané lokalitě a alternativní možnosti hubení potkanů. Kontrolujte bezpečné ukotvení deratizačních staniček, chraňte nástrahu od vlivů počasí a vždy je rozmístíte mimo dosah dětí a necílových domácích a volně žijících zvířat. Vždy používejte očko určené pro kotvení nástrahy, aby bylo zamezeno odnášení nástrahy z deratizačních staniček. Při vnější ochraně objektu rozmístíte deratizační staničky jen do vzdálenosti 50 m od objektu.

Pro maximalizaci účinnosti přípravku PROTECT[®] Sewer Block odstraňte, nebo minimalizujte alternativní zdroje potravy potkanů v dané lokalitě. Staničky kontrolujte pravidelně každé 3-7 dní. Pokud je nástraha potkany spotřebována, doplňte ji. Nástrahu vyměňte, pokud je na ní plíseň, nebo je jinak znečištěna nebo poškozena. Nástrahu je třeba doplňovat, pokud je zaznamenáván její úbytek. Poznámka: Potkani jsou obezřetní a může se stát, že jsou vidět jejich stopy, ale není zaznamenán odběr nástrahy po 2-3 dny. V tomto případě deratizační staničky přemístíte na jiná místa. Nástrahu PROTECT[®] Sewer Block je možné použít v kanalizační síti, v rozvodných a průmyslových kanálech, stokách a vodních roklinách.

Nástrahu PROTECT[®] Sewer Block v kanalizační síti umísťujte pokud možno vždy do speciálně upravených deratizačních staniček. Pokud je to možné, vždy použijte očko a nástrahu připevněte pomocí drátu k poklopu nebo k mřížce. Dbejte o to, aby se nástraha nedostala do vody, ale zároveň byla dostatečně přístupná pro potkany.

Dávkovací tabulka:

Hmotnost jednoho bloku je 75 g.

Kanalizační síť - rozvodné a průmyslové kanalizace - vodní stoky 75-225 g/deratizační staničku

Uvnitř a vně objektů 75 g-150 g/deratizační staničku

Recyklační místa, smetiště, kolem popelnic apod. 75 g -150 g/deratizační staničku

Při výběru nástrahy je třeba přihlížet k případné rezistenci potkanů. Během deratizačního zásahu pravidelně odstraňujte uhynulé potkany, minimálně při každé kontrole nástrahy. Aby bylo sníženo riziko kontaminace prostředí a otrav necílových druhů, sesbírejte po skončení deratizačního zásahu všechny deratizační staničky a nástrahu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Deratizační staničky rozmístěné v objektech a mimo objektů je nutné označit následovně:

- Datum rozmístění a interval kontroly
- Informace ohledně zastižení
- Název přípravku a číslo rozhodnutí
- Výstraha pro děti a domácí zvířata
- Národní rizikové informace

Přípravek obsahuje denatónium-benzoát, který chrání proti náhodnému požití ze strany člověka.

Upozornění:

Přípravek je určen jen na hubení potkanů. Při jeho použití dodržujte návod použití. Skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, čistých, uzamčených a dobře větratelných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

Zbytky přípravku a jeho kontaminované obaly musí být likvidovány jako nebezpečný odpad.

Pokyny pro první pomoc:

Obecně: V případě, že máte podezření na otravu přípravkem, vyhledejte bezodkladně lékařské ošetření a lékaři ukažte tento návod k použití, obal přípravku nebo bezpečnostní list přípravku.

Při polknutí: Vypláchněte ústa vodou. Postiženým v bezvědomí nepodávejte nic ústy. Zvracení vyvolejte jen po konzultaci s lékařem. Vyhledejte bezodkladně lékařské ošetření, ukažte obal přípravku, návod k použití nebo bezpečnostní list přípravku.

Při kontaminaci kůže: Sundejte kontaminovaný oděv a znovu jej použijte po vyprání. Umyjte zasaženou kůži mýdlem a velkým množstvím vody. Jestliže máte zdravotní problémy, vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte. Široce otevřené zasažené oko/oči vyplachujte velkým množstvím vody po dobu několika minut. Jestliže podráždění očí přetrvává, vyhledejte očního lékaře.

Informace pro lékaře:

Přípravek obsahuje jako účinnou látku antikoagulant bromadiolon. Po pozření přípravku může být snížena srážlivost krve postižené osoby a může se objevit vnitřní krvácení. Prvé příznaky otravy se mohou projevit až po několika dnech po pozření.

První pomoc a léčbu je možné konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, Praha 1, 128 21, Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575
e-mail: tis@cesnet.cz

Antidotum: Vitamin K1 (Účinnost léčby je nutné laboratorně kontrolovat)

Balení a obsah:

75 gramů: 100 ks v kartonovém obalu 7,5 kg netto

Datum výroby: na obalu

Spotřebujte: do 2 let od data výroby uvedeném na etiketě.

Zařazení produktu:

Xn Zdraví škodlivý

R věty:

R48/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním

S věty:

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S37: Používejte vhodné ochranné rukavice

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S49: Uchovávejte pouze v původním obalu

Účinná látka: 0,05 g / kg bromadiolon

Číslo povolení: CZ-2013-0035

Typ přípravku TP 14 – rodenticid

Výrobce:

Bábolna Bio kft. Budapest Szállás u 6, Maďarsko

Distributor v ČR:

SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín-Přiluky, tel.: 577 218 701, www.slom.cz, slom@slom.cz