

1Kg

SOMI



► INSEKTICIDNÍ POPRAŠ

Deltamethrin 0,5 g / kg (0,05%)

Výrobce:
Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
Belgium

Dovozce do ČR:



PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Formulace: Popraš (DP)

Účinná látka: deltamethrin 0,5 g/kg (0,05%)

Chemická skupina: Pyrethroid

Vzhled přípravku: bílý prášek, bez zápachu

Cílové druhy:

Rusi, švábi, mravenci, štěnice, blechy, pavouci aj.

Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR 28564/2013/SOZ

Symbol nebezpečnosti:



NEBEZPEČNÝ PRO
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

R50/53 Vysoko toxiccký pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S2: Uchovávejte z dosahu dětí
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S22 Nevdechujte prach.
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice.

S45: V případě úrazu nebo necititeli do dobré, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto oznámení)
S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad
S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Dodržujte etiketu, abyste zabránili ohrožení zdraví lidí a životního prostředí.

Bezpečnostní opatření

Při manipulaci s přípravkem a při jeho aplikaci nosete ochranný oděv a ochranné brýly. Kontaminovaný ochranný oděv použijte znova až po vyprání.



Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Po skončení práce s přípravkem si umyte ruce vodou a mydlem.

Před aplikací přípravku odstraňte nebo dobře přikryjte potraviny a nápoje.

Může působit dočasné podráždění očí, sliznic a kůže

Toxiccký pro ryby a vodní organismy.

Nekontaminujte vodní zdroje, vodní toky a vodní nádrže přípravkem ani jeho obaly.

Mechanismus účinnosti:

Účinná látka deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy, působí kontaktně i požerově. Deltamethrin působí téměř okamžitě omráčení a rychlé uhnutí tem, že blokuje přenos nervových impulsů.

Návod k použití:

SOMI se aplikuje v tenké vrstvě na místa, kde se hmyz ukryvá (pod nabytkem, v rozích apod.).

Před použitím si přectěte důkladně návod k použití.

Abyste se vyhnuly ohrožení zdraví lidí dodržujte návod k použití.

Aplikujte přímo na podlahové lišty a/nebo na podlahu. Přípravek nesmí být rozptýlován do vzduchu.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Neaplujte na přítomnosti jiných osob nebo zvířat. Nemíchejte s jinými přípravky.

Vyhnete se kontaktu s ošetřenými povrchy.

V potravinářských provozovnách může být přípravek SOMI aplikován jen v případě, že byly potraviny odstraněny nebo dobré zakryty.

Dávkování:

Mravenci: přípravek SOMI aplikujte v dávkách 10 až 20 g na hnizdo. Po 10 minutách mravenci uhnou. Pokud nelze hnizdo nalézt, aplikujte na místa častého výskytu mravenců v dávkách 20 až 30 g přípravku na m². Aplikaci opakujte několikrát, v tydenních intervalech.

Rusi, švábi, blechy, štěnice, pavouci: Aplikujte 20 až 30 g přípravku SOMI na m².

V potravinářském průmyslu by měli přípravek používat pouze osoby s příslušnou odbornou způsobilostí.

Preventivní opatření:

Může vyvolat alergické reakce. Udržujte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo potraviny nápoje a krmiva. Nevdechujte prach. Nošte vhodné ochranné rukavice.

Pokud se necítí dobře, vyhledejte okamžité lékařské ošetření (pokud možno ukažte tento návod k použití). Tento materiál a jeho obaly jsou nebezpečným odpadem.

První pomoc:

Při nahodném požití: nevyvolávejte zvracení. Postiženému nepodávejte nic k pití ani k jídlu. Přesvědčte se, zda jsou dýchací cesty volné. Vypláchněte ústa vodou a zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí: Otevřené oko/ocí vypláchněte proudem čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Zasažené místo omýjte vodou a mydlem.

Při vděchnutí: Vyvedte postiženého na čerstvý vzduch ale udržujte jej v teple. Zajistěte lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, na Božího 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

Skladování:

Přípravek skladujte v suchých, chladných a uzamykatelných prostorách, odděleně od potravin, nápojů a krmív. Skladujte v originálních obalech, mimo dosah dětí a domácích živoč. S přípravkem nakládejte a obaly s ním otevřejte tak, aby nedocházelo k úniku přípravku do okolí. Chraňte před zvlnutím.



Odražování obalů a zbytků přípravku:

Přípravek s obalem úplně spotřebujte. Prázdné obaly nepoužívejte ani po vypláchnutí pro jiné účely. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Balení: 1 kg

Číslo šárže a datum výroby: viz obal.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

