



Deralan G

Charakteristika

Deratizační nástraha k přímému použití ve formě granulí, určená k hubení myší domácích (*Mus musculus*), potkanů (*Rattus norvegicus*) a krys (*Rattus rattus*) při aplikaci v komerčních deratizačních staničkách, s vnitřním obalem po 20 g.

Přípravek je určen k profesionálnímu i k neprofesionálnímu použití

Biocidní přípravek: rodenticid, TP 14

Účinná látka: 0.05 g/kg (0,005 %) bromadiolon

**Číslo povolení: Oznámeno dle § 35 Zákona č.120/2002 Sb., č. j. MZDR 20746/2013/SOZ,
ze dne 10. 1. 2013**

Upozornění:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Zabraňte kontaktu s očima, sliznicemi a kůží.

Při práci s přípravkem používejte pracovní oděv, pracovní rukavice. Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Před jídlem, pitím a kouřením a po skončení práce je nutné si umýt ruce vodou a mýdlem. Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, nápojů, krmiv ani jejich obalů, ani ke kontaminaci kuchyňského náčiní. Je-li nutná dekontaminace povrchu znečistěného přípravkem, použijte houbu navlhčenou v 5% roztoku chloridu sodného.

Nepoužívejte ve volné přírodě ani proti necílovým organismům.

Přípravek může být používán pouze k hubení škodlivých hlodavců podle návodu k použití a v doporučeném dávkování.

Přípravek je toxicický pro savce a ptáky. Psi, kočky, prasata a jiní predátoři a mrchožrouti mohou být otráveni požíráním uhynulých nebo hynoucích škodlivých hlodavců, ovlivněných přípravkem.

Přípravek musí být aplikován v komerčních deratizačních staničkách, které brání přístupu nepovolených osob a necílových organismů k nástraze. V ideálním případě by měly být deratizační staničky připevněny k podlaze.

Při profesionálním použití přípravku na veřejně přístupných místech ve veřejných budovách musí být umístěno viditelné oznámení, že je prováděna deratizace za použití tohoto přípravku. Oznámení musí dále obsahovat upozornění na možnost primární a sekundární otravy, uvedeny opatření první pomoci a kontakt na firmu, která zásah provádí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte etiketu.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Mechanismus účinnosti:

Účinnou látkou přípravku „Derlan G“ je bromadiolon , který patří mezi antikoagulanty. Je-li přípravek hlodavci pozřen, bromadiolon snižuje srážlivost jejich krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a hlodavci hynou postupným vnějším i vnitřním vykrvácením. Přípravek „Deralan G“ působí uhynutí hlodavců již při jednorázovém požití, je velmi dobře přijímám a úhyn hlodavců nastává 3 až 10 dní po požití přípravku. Přípravek proto nevyvolává obranný reflex.

Návod na použití:

Přípravek aplikujte v komerčních deratizačních staničkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci a staničky umístěte pouze na místa, kde byl zjištěn výskyt hlodavců. Před aplikací přípravku odstraňte, pokud to je možné, všechny zdroje potravy hlodavců, nebo zdroje potravy podle možností zredukujte. Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu. Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách a v jejich bezprostředním okolí.

Dávkování:

Myš domácí: 40 g nástrahy v deratizační staničce na každých 100 m² podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.

Potkan a krysa: 60 až 100 g nástrahy v deratizační staničce na každých 100 m² podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.

Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku, antidotum a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Dále upozornění, že se se staničkou nesmí manipulovat ani ji otevřít.

Deratizační staničky s nástrahou pravidelně kontrolujte. Poškozenou nástrahu nahraďte nástrahou čerstvou. Nástrahu doplňujte, dokud trvá její konzumace hlodavci a dokud hlodavci nevymizí. Během deratizačního zásahu je nutné, minimálně v době kontrol a doplňování deratizačních staniček, sbírat uhynulé hlodavce a likvidovat je v souladu s právními předpisy.

Pokud je nástraha trvale spotřebovávána zvyšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich. Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa. V soukromých objektech, sklepích, garážích, zahradních stavbách apod. může být přípravek použit neprofesionálně. Ve veřejných budovách a provozovnách, úřadech a průmyslových a komerčních objektech a jejich bezprostředním okolí, musí být přípravek používán profesionálně. Přípravek může být aplikován jen na místa skutečného výskytu myší domácích, potkanů a krys.

Hlodavci začínají hynout za 3-5 dní po konzumaci nástrahy. Po vymizení potkanů odstraňte deratizační staničky se zbytky nástrahy a odstraňte i případné zavlečené zbytky nástrahy. Pokud se hlodavci na ošetřené ploše znova objeví, deratizační zásah opakujte.

První pomoc:

Obecně: V případě, že máte podezření na otravu přípravkem, vyhledejte bezodkladně lékařské ošetření a lékař ukažte tento návod k použití, obal přípravku nebo bezpečnostní list přípravku. Na pracovišti pro případ první pomoci musí být k dispozici absorpční uhlí

Při nadýchání: V případě nadýchání prachu vyvést postiženého na čerstvý vzduch. V případě potřeby konzultovat s lékařem.

Při kontaminaci kůže: Odložte potřsněný oděv a obuv, důkladně se omyjte mýdlem a vodou. Zasažené místo pozorujte po dobu 24 hodin, v případě přetravajících příznaků vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení očí: Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Jestliže podráždění přetravává, vyhledejte lékařské ošetření

Při polknutí: Ihned po požití vypolat zvracení. Později zvracení nevyvolávat, aby se nezvýšilo riziko vnitřního krvácení. Podat absorpcní uhlí v dávce 25 – 100 mg a konzultovat na toxikologickém informačním centru. Vyhledejte neprodleně lékařské ošetření.

Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem bromadiolonem je vitamín K (kanavit fytomenandion) Pozor: jako antidotum není vhodný vitamín K3 (menandion), ani vitamín K4 (menandiol). Po požití vykonat výplach žaludku. Důležité je zjistit srážlivost krve (provést urychleně stanovení protrombínové doby). Pro obnovení srážlivosti krve podat vitamin K (orálně nebo parenterálně-infuzí) Počáteční dávka antipoda : dospělí nad 12 roků : 15 - 25 mg, děti do 12 roků : 5 -10 mg .

Specifické příznaky: průjem po požití, zvracení, indispozice, krvácení z nosu, dásní. Vnitřní krvácení vedoucí k šoku a kómatu.

Léčbu postiženého může lékař konzultovat s příslušným toxikologickým střediskem v Praze: Klinika nemocí z povolání, toxikologické informační středisko, Vyšehradská 49, 128 21 Praha 1, tel: 224919293. Kontaktní osoba SLOM, s.r.o. – Dr. Oldřich Bubrinka , tel. 603 480 024

Při poskytování první pomoci nejsou ochranný oděv a ochranné pomůcky nutné.

Skladování:

Dobře uzavřené originální obaly s přípravkem, skladujte v chladných, suchých a dobře větraných místnostech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků, dezinfekčních prostředků, jiných chemických látkek a obalů od těchto látkek. Zamezte přístupu nepovolaným osobám a domácím zvířatům. Chraňte před přímými slunečními paprsky. Udržujte mimo dosah zdrojů zapálení.

Likvidace obalů a zbytků přípravku.

Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte v označených nádobách a předejte osobám oprávněným k likvidaci nebezpečného odpadu.

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení: **Neprofesionální balení:** balení o obsahu 500 g. **Profesionální balení:** pytle s obsahem 25 kg granulí.

Výrobce: Ing. Martin Čapoš DDD, PEST CONTROL, Voderady 195, 919 42 Voderady, Slovenská republika

Dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky, Tel./fax:
+420 577 218 701, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 49/2007 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno.