

Lepová past (monitor) na Štěnice - BB detektor + FEROMON (feromonová kapsle)

Popis výrobku:

Lepová past na štěnice k monitoringu výskytu štěnic před i po dezinsekčním zásahu.

Feromonová kapsle obsahuje agregační (shromažďovací) feromon štěnic.

Štěnice se do vhodných úkrytů svolávají právě pomocí agregačního feromonu. Tento feromon (na rozdíl od sexuálního feromonu) láká obě pohlaví a všechna pohyblivá vývojová stadia štěnic. Použitím lepové pasti spolu s feromonovou kapslí obsahující agregační feromon lze využít přirozeného chování štěnic k jejich monitoringu.

Výhody:

Citlivá detekce i při nízkém zamoření

Detekce všech pohyblivých vývojových stadií

Rychlý a snadno použitelný

Bez insekticidů

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody

Obsah balení:

10 ks lepových pastí na štěnice (BB detektor)

10 ks feromonových kapslí - kapsle jsou baleny po pěti kusech v neprodyšných sáčcích

1 x návod k použití

Návod k použití:

- Odtrhněte od sebe jednotlivé pasti v místě perforace (pasti jsou vyráběny po dvojicích)

- Opatrně rozevřete past

- Okraje pasti ohněte na vyznačených místech. v úhlu cca 30°

- Odstraňte krycí papír chránící vrstvu lepidla

- Vyjměte feromonovou kapsli ze sáčku – **nepokoušejte se feromonovou kapsli otevřít!** Po vyjmutí ze sáčků je již připravena k použití.

- Umístěte feromonovou kapsli do středu lepové plochy pasti

- Složte past dle obrázku na její spodní straně. (Spojením obou protilehlých stran k sobě)

- Umístěte lepovou past na štěnice v ložnici na podlahu hned u zdi pod čelem postele.

Doporučují se 2 pasti pod každou postel. Lepové pasti by měly být v místnosti minimálně po dobu jednoho týdne.

V případě, že provádíte monitoring ve více místnostech, můžete použít tabulku na spodní straně pastí k jejich označení (číslo, umístění, datum, počet odchycených štěnic).

Pokud není na lepové pasti zachycena žádná štěnice, neznamená to, že se v kontrolované místnosti nevyskytují. Na základě vyhodnocení monitoringu mohou být provedena další opatření.

Nelze použít k vyhubení štěnic!

Lepovou past na štěnice je možné v neporušených obalech skladovat 2 roky od data výroby. Doba expirace feromonových kapslí je vyznačena na obalu. **Účinnost feromonu po rozbalení je dva týdny!**

Pokyny pro bezpečné skladování:

P4510+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F

P402 Skladujte na suchém místě.

Výrobce: **Suterra**, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5SU, UK Prepared by: Mr C Dyball (CDyball@suterra.com)

Dovozce a distributor v ČR: **Samura s.r.o.** Ke Klíčovu 8, 190 00 Praha 9, +420 244 911 220

www.samura.cz