

# KILRAT ® Plus extrudovaná kostka

® ochranná známka Bábolna Bio.

**Před otevřením si pozorně přečtěte návod!**  
**JED NA POTKANY A MYŠI!**  
**Biocidní výrobek používejte bezpečně!**

Oznámeno dle § 35 Zákona č.120/2002 Sb., č.j. MZDR 3787/2012/SOZ, ze dne 1.2. 2012

**Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 84/2012 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno.**

## **Přednosti:**

KILRAT ® plus vyniká svojí odolností proti vlhku a je vhodný do vlhkých prostor jako kanalizace, sklepy apod. Svým složením je pro myši a potkany vysoce atraktivní, podporuje hlodání. Účinná látka s tzv. účinkem na druhý den, zaručuje spolehlivou a rychlou účinnost přípravku, hlodavci nepoznají, že konzumují nebezpečnou látku a ochranná látka BITREX zabraňuje náhodnému požití. Lehce kontrolovatelný požer podle stop na kostce. Velmi dobrý odběr ze strany hlodavců.

## **Použití:**

**Při výskytu potkanů v interiéru**, hospody, sklady apod.: 4x50g /1 krmné místo/ rozložte na tmavá místa, nejlépe na neviditelná místa, kde je vidět stopy jako trus apod. za účelem vytvoření tzv. krmných míst na tácky, nebo do uzamykatelných nástrahových staniček s možností kotvení nástrahy.

**Exteriér:** 4x50g rozložte na suchá a chráněná místa od dětí a domácích zvířat za účelem vytvoření tzv. krmných míst na tácky, nebo do uzamykatelných nástrahových staniček s možností kotvení nástrahy. Krmná místa označte štítkem.

Doporučujeme při výskytu potkanů 1 krmné místo po 7-10 metrech.

**Do kanalizační sítě:** 4x50g do kanalizačních dřevěných nástrahových staniček na nožičkách. Kontrolujte po 2-3 dnech a úbytek, nebo znečištěné nástrahy doplňujte.

**Při výskytu myší v interiéru** 2x25g /1 krmné místo/ rozložte na tmavá místa za účelem vytvoření tzv. krmných míst na tácky, nebo do uzamykatelných nástrahových staniček s možností kotvení nástrahy. Pro střední zamoření 1 krmné místo/5m<sup>2</sup> plochy. Pro silné zamoření 1-2 krmné místa /5m<sup>2</sup> plochy.

**Exteriér:** Při výskytu myší 2x25g /1 krmné místo/ rozložte na suchá a chráněná místa od dětí a domácích zvířat za účelem vytvoření tzv. krmných míst na tácky, nebo do uzamykatelných nástrahových staniček s možností kotvení nástrahy. Krmná místa označte štítkem. Pro střední zamoření 1 krmné místo /5m<sup>2</sup> plochy. Pro silné zamoření 1-2 krmné místa /5m<sup>2</sup> plochy.

Úhyn nastává následkem požeru po 3-4 dnech. Krmná místa kontrolujte po 4-7 dnech a nástrahu doplňujte, pokud je výskyt hlodavců. Pokud není zaznamenán požer a hlodavci se nadále vyskytují je třeba krmná místa nahradit jiným místem. Účinnosti se dosahuje při dodržení postupu cca za 2-3 týdny v závislosti od stupně zamoření. Celkové vyhubení hlodavců od velikosti prostoru a stupně zamoření můžete dosáhnout po dostatečném rozmístění nástrahy po 2-3 týdnech. V případě jestliže nástrahy jsou nedotknuté a hlodavci se nadále vyskytují je třeba nástrahy přemístit. Nepokládejte na místa, kde by byl dosažitelný domácími, hospodářskými, nebo volně žijícími zvířaty!

## **Bezpečnostní opatření:**

Při práci používejte pracovní oblek, ochranné rukavice a obuv.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte!

### **První pomoc:**

#### ***Po nadýchání :***

U postiženého zabezpečte pobyt na čerstvém vzduchu, klid, teplo. Přivolejte lékaře.

#### ***Při náhodném požití:***

Po požití přípravku vypláchněte ústa důkladně vodou, vypijte 0,3 l vlažné vody a nevyvolávejte zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc!

#### ***Při kontaminaci očí:***

Tyto vyplachovat proudem pitné vody po dobu 10 – 15 minut, jestli zarudnutí přetrvává zabezpečit vyšetření u očního lékaře.

#### ***Při zasažení obleku a kontaminaci pokožky:***

Oblek vysvléci a postižené místo umýt teplou vodou a mýdlem. Při otravě anebo podezření na otravu přivolejte lékaře a informujte ho o složení přípravku a poskytnuté první pomoci. Léčbu postiženého může lékař konzultovat s příslušnými toxikologickými středisky v Praze: Klinika nemocí z povolání, toxikologické informační středisko, Vyšehradská 49, 128 21 Praha 1, tel: 2491 5396.

**Informace pro lékaře:** protilátka K1 – vitamin /Konakion inj/

### **Skladování:**

Skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, čistých, uzamčených a dobře větratelných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv, léků, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek

### **Spotřebujte:**

do 3 let od data výroby uvedeném na etiketě.

### **Likvidace:**

Prázdné obaly, kart. krabice spalte v příslušné spalovně. Uhynulé hlodavce posbírejte při použití ochranných rukavic do igelitového sáčku, spalte, nebo zakopejte hluboko do země na odlehlém místě, dostatečně vzdáleném mimo obydlí a mimo dosah dětí.

### **Účinná látka:**

Brodifacoum 0,05g/kg

### **Výrobce:**

#### **Distribuce v EU :**

Bábolna Bio kft Budapešť

#### **Distribuce pro Českou republiku:**

SLOM, s.r.o. , Staromlýnská 47, Zlín 760 01, tel. 57 74311 28 , FAX: 57 721 87 01, e-mail:

[slom@slom.cz](mailto:slom@slom.cz), e-shop: [www.slom.cz](http://www.slom.cz)

### **Balení a obsah:**

1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 kg v plastovém obalu. 25; 30 kg ve fólii a v papírovém sudu.

### **Balení a obsah:**

20; 25 a 50g extr. kostky v 100; 200; 400 a 500g plastové fólii.