

CIPEX 10 E

CIPEX 10 E

Přípravek je určen k profesionálnímu použití

Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje

Cypermethrin 92% (cis/trans 40/60) 10,25 g (94,3 g/l)

Ko-formulanty do 100 g

NEBEZPEČÍ



OBSAHUJE: kalcium dodecylbenzen sulfonat, lineární

OZNAČENÍ RIZIK:

H 318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P337+P313 Přežívá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

OZNAMOVATEL:

BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Itálie

Tel (+39) 0543 754430

VÝROBCE:

FERBI S.r.l. – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S.Angelo (TE), Itálie

SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie

DOVOZCE A DISTRIBUTOR V ČR:

SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky

Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

Číslo povolení:

BALENÍ: 1-10 L

CHARAKTERISTIKA:

Insekticidní emulgovatelný koncentrát, určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem proti širokému spektru škodlivého létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, pakomáři, vosy, zavíječi, tiplici a muchničky, a lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, mravenci, rybenky, pavouci, brouci, blechy, apod. v bytech, školách, veřejných budovách, úřadech, rekreačních objektech, hotelích, ubytovných zařízeních, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, v průmyslových provozovnách, v objektech živočišné výroby, v objektech chovů zvířat, v prostředcích veřejné dopravy a pro hubení dospělých komárů v okolí obytných budov pod.

UPOZORNĚNÍ:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevedechujte aerosol přípravku. Vstup

do ošetřených prostorů, zejména obytných místností a pracovních prostorů, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte za přítomnosti zvířat. Nepoužívejte k ochraně rostlin. Neaplikujte na rostliny určené ke konzumaci lidí nebo domácích zvířat.

Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.

MECHANISMUS ÚČINNOSTI:

Přípravek CIPEX 10 E je emulgovatelným insekticidním koncentrátem, obsahujícím syntetický pyretroid cypermethrin, jako účinnou látku, která zajišťuje jeho rychlý a dlouhodobý účinek. Přípravek účinkuje na hmyz kontaktně. Ko-formulanty přípravku jsou rychle rozkládány, aniž by během rozkladu uvolňovaly nebezpečné produkty.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Přípravek CIPEX 10 E naředíte vodou a aplikujte postřikem na všechna místa výskytu a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr na 15 m² ošetřené plochy při následujícím ředění:

Létající hmyz:

Ve vnitřním prostoru: přípravek naředíte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) podle síly zamoření a aplikujte na všechny povrchy, na které hmyz sedá a v noci nebo ve dne odpočívá (stěny, strop, žaluzie apod.). Vyšší koncentrace je doporučena pro hubení much.

V okolí budov: přípravek naředíte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na vnější stěny budov nebo na vegetaci, ve které se přes den ukrývají komáři. V tom případě aplikujte takové množství přípravku, aby z vegetace neokapával.

Lezoucí hmyz:

Ve vnitřním prostoru: přípravek naředíte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) podle síly zamoření a aplikujte na všechna místa výskytu a do všech úkrytů hmyzu (do štěrbin a prasklin, za lišty a obložení stěn apod.). Vyšší dávka je doporučena proti rusům a švábům.

V okolí budov: přípravek naředíte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na vnější stěny budov, chodníky apod.

Přípravek CIPEX 10 E může být naředěn vodou na 2% směs (tj. 2000 ml přípravku do 100 litrů vody) a aplikován ve formě studeného nebo horkého aerosolu v dávkách 0,5-1 litr na 1 ha nebo 0,5-2 litry na každých 1000 m³ vnitřního prostoru.

UPOZORNĚNÍ:

Naředěný přípravek spotřebujte během dne jeho přípravy.

V potravinářských provozovnách i v jiných typech prostor odstraňte před postřikem potraviny, nápoje a krmiva, nebo je zajistěte, aby nebyly postřikem přímo zasaženy. Při aplikaci postřiku v objektech

živočišné výroby a chovu zvířat provádějte postřik bez přítomnosti zvířat a zvířata vraťte až po úplném zaschnutí postřiku.

Přípravek CIPEX 10 E nepoškozuje ošetřené povrchy. V případě pochybností vyzkoušejte nejdříve postřik na malé, nenápadné ploše.

Výrobce ani distributor není zodpovědný za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Za tyto případné škody zodpovídá uživatel.

PRVNÍ POMOC:

Informace pro lékaře:

Pharmakodynamika účinných látek: přerušují přenos nervových impulzů. **Terapie:** Symptomatická.

- Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.
- Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.
- Při zasažení očí: Zasažené oko/occhi vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci není ochranný oděv a pomůcky nutný.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání,

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575,
e-mail: tis@.cesnet.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU.

Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.

DOBA POUŽITELNOSTI

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

ČÍSLO ŠARŽE:..... DATUM VÝROBY:.....