

## PERTEX

### PERTEX

*Přípravek je určen k profesionálnímu použití*

**Biocidní přípravek: insekticid, TP 18**

**Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje**

**Permethrin (93%) (cis/trans 25/75) 3 g (30.6 g/l)**

**Piperonyl butoxid (80%) 3 g (30.6 g/l)**

**Emulgátory a voda do 100 g**

**OBSAHUJE: Ethoxylovaný alcohol, permethrin**

### OZNAČENÍ RIZIK:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

### NEBEZPEČÍ



### OZNAMOVATEL:

**BLEU LINE S.r.l.** Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Itálie  
Tel (+39) 0543 754430

### VÝROBCE:

**FERBI S.r.l.** – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S.Angelo (TE), Itálie  
**SELECTA S.r.l.** Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie

### DOVOZCE A DISTRIBUTOR V ČR:

**SLOM, s.r.o.**, Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky  
Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

**Číslo povolení:** .....

**BALENÍ:** 1-10 L

### CHARAKTERISTIKA:

Insekticidní emulzní koncentrát určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem pomocí nízkotlakých postřikovačů proti škodlivému hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, vosy mravenci, rusi a švábi, blechy, brouci apod. v restauracích, hotelích, jídelnách, pekárnách, ve výrobnách, skladech a prodejnách potravin, mlýnech, prázdných silech, na jatkách, objektech živočišné výroby a ve stájích, ve veřejných

budovách, úřadech, zdravotnických zařízeních, školách, kasárnách, kinech, divadlech, veřejných knihovnách, ubytovnách, prostředcích hromadné dopravy, proti dospělým komárům v místech jejich zvýšeného výskytu apod.

## UPOZORNĚNÍ:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevedechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte k ochraně rostlin.

Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.

## MECHANISMUS ÚČINNOSTI:

Účinnou látkou přípravku Pertex je syntetický pyrethroid permethrin, jehož účinnost je zesilována synergistou piperonyl butoxid. Přípravek působí kontaktně, rychle a má dlouhodobou reziduální účinnost.

## NÁVOD NA POUŽITÍ:

Před použitím přípravek dobře potřepajte, nařed'te bezprostředně před jeho aplikací a naředěný přípravek spotřebujte do 8 – 10 hodin po naředění.

Proti zdravotně významným členovcům, jako jsou mouchy, rusi, šváby, komáři apod., přípravek nařed'te na 2% pracovní směs (100 ml přípravku smíchejte s 5 litry vody) a aplikujte postřikem za pomoci nízkotlakých postřikovačů, v množství 50 ml směsi na každý ošetřený m<sup>2</sup> plochy. Postřik aplikujte na místa výskytu a do úkrytů členovců.

Proti ektoparazitům ptáků v drůbežárnách, používejte přípravek v koncentraci 1%.

V objektech živočišné výroby je možné přípravek aplikovat jen bez přítomnosti zvířat.

## PRVNÍ POMOC:

### Informace pro lékaře:

**Pharmakodynamika účinných látek:** přerušují přenos nervových impulzů. **Terapie:** Symptomatická.

- Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.
- Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.

- Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci není ochranný oděv a pomůcky nutný.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání,

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575, e-mail: [tis@cesnet.cz](mailto:tis@cesnet.cz)

### **SKLADOVÁNÍ:**

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

### **LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU:**

Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.

### **DOBA POUŽITELNOSTI:**

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

### **ČÍSLO ŠARŽE:.... DATUM VÝROBY:**