



SPC produktu

BRODER G



Nástraha k přímému použití
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
KATEGORIE UŽIVATELŮ: Odborníci a vyškolení odborníci

OBLAST POUŽITÍ: Vnitřní prostory, venkovní prostory v okolí budov

Složení:

100 g přípravku obsahuje:
Brodifakum (č. CAS 56073-10-0, č. ES 259-980-5) 0,005 g

Pomocné látky a látkové substance do 100 g



NEBEZPEČÍ

Výstražné upozornění

H360D: Může poškodit plod v těle matky.

H373: Může způsobit poškození orgánů krve při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P202: Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.

P280: Používejte ochranné rukavice.

P260: Nevdechujte prach.

P308 + P313: Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501: Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě.

BIODIČNÍ PŘÍPRAVEK (PT14)

Číslo povolení: CZ-2015-0006

UFI: MQ8U-4NDE-6Y1N-KFQF

Držitel povolení a výrobní závody

Insekta Pest Control s.r.o., Poštová 31, 91701 Trnava, Slovensko

Výrobce účinné látky:

Dr Tezza S.r.l., Via Tre Ponti 22, 37050 S.

Maria di Zevio, Itálie

Distributor pro ČR:

SLOM, s.r.o., U Tescomy 251, Zlín – Lužkovičky, 76001,

Tel: +420 774 736 855, email: slom@slom.cz,

www.slom.cz

Balení: Balení od 3 kg do 25 kg obsahující nástrahu. V případě potřeby je nástraha balena do samostatných pytlů s maximální hmotností 10 kg. Obalový materiál: plastový kompozit (polyester/PET/polyethylen), HDPE, karton s plastovou vložkou.

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Číslo sáze: Datum výroby

INFORMACE PRO LÉKÁŘE

Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku. V případě požití se příznaky mohou projevit do 72 hodin. Klinické projevy mohou zahrnovat krvácení z nosu a dásní. V závažných případech se mohou objevit modřiny a krev ve stolici nebo moči.

Antidotum: Vitamin K1 podávaný pouze lékařem nebo veterinárním lékařem.

V případě:

Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte vodou a následně vodou a mýdlem.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokračujte ve vyplachování.

Při náhodném požití: Důkladně vypláchněte ústa vodou. Osobě v bezvědomí nepodávejte nic ústy. Nevyměňujte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu přípravku.

V případě požití domácím zvířetem: Kontaktujte veterinárního lékaře.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402
Kontaktní osoba SLOM, s.r.o. – Petr Bubrinka, tel. 603 101 743

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Broder G je antikoagulační rodenticidní nástraha k přímému použití s účinnou látkou brodifakum, účinná proti myši domácí (Mus musculus), potkanu obecnému (Rattus norvegicus) a krysám obecným (Rattus rattus), a to již po

jednorázovém požití. Nástraha je atraktivní pro uvedené druhy hlodavců a nebudí podezření u ostatních jedinců populace. Obsahuje hořkou látku a barvivo k prevenci náhodného požití. Přípravek lze použít ve vnitřních prostorech průmyslových, venkovských a obytných budov, sklepů, garáží, skladů a v okolí budov.

ČÍLOVÉ ORGANISMY

Myš domácí (Mus musculus), mláďata i dospělí
Potkan obecný (Rattus norvegicus), mláďata i dospělí

Krysa obecná (Rattus rattus), mláďata i dospělí

ZPŮSOB APLIKACE

Nástraha k přímému použití v deratizačních stanicích odolných proti násilnému otevření nebo v krytých a chráněných nástrahových místech, pokud poskytují stejnou úroveň ochrany pro lidi a necílové druhy jako deratizační stanice. Stanice musí být označeny následujícími informacemi: „nepřemisťovat a neotevírat“, „obsahuje rodenticid“, „název přípravku nebo číslo povolení“, „účinná látka“, „v případě nehody volejte toxikologické informační středisko tel: 224 919 293 nebo 224 915 402“.

Nástrahu umístěte do deratizační stanice pomocí dávkovacího zařízení.

NÁVOD K POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte návod a řiďte se informacemi o výrobku, jakož i veškerými informacemi, které jsou k produktu připojeny, nebo které jsou k dispozici v místě prodeje.

Průzkum a příprava: Před položením nástrahy proveďte průzkum oblasti zamořené hlodavci a zjistěte jeho druh, místa aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu zamoření a potřebný rozsah zásahu.

Odstraňte potravu, která je pro hlodavce pravidelně a snadno dosažitelná (např. rozsypané krmivo, zbytek potravin apod.). Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před položením deratizačních stanic s nástrahou neuklizejte, protože to by hlodavce zbytečně vyrušilo a snížilo příjem nástrahy.

Deratizační přípravek by měl být používán pouze jako součást integrované ochrany, která zahrnuje sanitační opatření a pokud je to možné, i fyzikální metody hubení.

Proveďte také preventivní opatření (přerušte přístupové cesty hlodavců, odstraňte zbytky potravin, krmiv a nápojů přístupných hlodavcům), což zvýší příjem přípravku hlodavci a sníží pravděpodobnost opětovného zamoření.

Umístění nástrahy: Deratizační stanice by měly být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla dříve pozorována aktivita hlodavců (např. cesty, hnízdiště, vývody, díry, nory atd.).

Tam, kde je to možné, musí být deratizační stanice uchyceny k zemi nebo k jiným konstrukcím.

Deratizační stanice musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemisťovány ani otevřeny.

Nástrahu musí být zajištěny tak, aby se zabránilo jejich vytažení z deratizační stanice. Výrobek umístěte mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových jedinců.

Výrobek umístěte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv, stejně jako nádobí nebo povrchů, které s nimi přicházejí do styku.

Je-li přípravek používán ve veřejných prostorech, měly by být ošetřené plochy po dobu deratizace označeny a poblíž nástrah musí být umístěno upozornění vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem společně s uvedením opatření první pomoci v případě otravy.

Manipulace a bezpečnost: Během fáze manipulace s výrobkem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (guma).

Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po použití produktu si umyjte ruce a kůži, která byla v přímém styku s produktem. Deratizační stanice je nutné pravidelně kontrolovat a ověřovat, zda nejsou porušeny a zda je nástraha hlodavci přijímána. V případě potřeby je nutné nástrahu doplnit. Při kontrolách stanic musí být odstraňována těla uhynulých hlodavců.

Pokud je příjem nástrahy nízký ve srovnání se zdánlivou velikostí výskytu, zvažte výměnu nástrahových krmných míst na další místa a zvažte možnost změny na jinou formulaci nástrahy.

Pokud po 35 dnech deratizace dochází i nadále k požíráni přípravku a není zaznamenán žádný pokles aktivity hlodavců, je nutné stanovit pravděpodobnou příčinu, například jejich

pronikání z okolí. Po vyloučení jiných možností je pravděpodobně, že hlodavci jsou rezistentní k použitému antikoagulantu. Zvažte možnost použití jiného než antikoagulačního rodenticidu nebo silnějšího antikoagulačního rodenticidu. Zvažte rovněž alternativní regulaci hlodavců pomocí pastí. Vyhledejte radu dodavatele přípravku nebo deratizační služby.

Aby bylo sníženo riziko sekundární otravy, odstraňujte během deratizačního zásahu uhynulé hlodavce v častých intervalech v souladu s metodickým pokynem Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace. Uhynulé hlodavce zneškodněte spálením prostřednictvím asanačních podniků. Při manipulaci s přípravkem nevdechujte prach, který může vznikat. Přípravek by neměl být dekantován.

Po ukončení deratizace: Odstraňte zbývající nástrahy nebo deratizační stanice po ukončení deratizačních prací. Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku. Zbytky přípravku a kontaminované obaly zlikvidujte jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

Ochrana životního prostředí: Pokud je to možné, před ošetřením informujte všechny případné dotčené osoby o prováděném deratizačním zásahu.

Při umísťování deratizačních stanic v blízkosti povrchových vod (např. řek, jezer, vodních kanálů, přehrad, zavlažovacích příkopů) nebo drenážních systémů zajistěte, aby se zabránilo kontaktu vody s nástrahou. Nepoužívejte v oblastech, kde je podezření na rezistenci na účinnou látku.

Výrobek nesmí být používán déle než 35 dní bez vyhodnocení stavu výskytu hlodavců a účinnosti ošetřené oblasti.

Přípravky mohou být použity k hubení pomocí trvalé aplikace nástrahy pouze na místech s vysokým potenciálem opětovného zamoření, pokud se ostatní metody regulace ukázaly jako nedostatečné.

Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou pulzní aplikace nástrahy.

Mezi jednotlivými aplikacemi neumývejte vodou deratizační stanice nebo přípravky používané v krytých a chráněných nástrahových místech. Za účelem oddělení vzniku rezistence nestřídejte použití různých antikoagulačních účinných látek se srovnatelnou nebo nižší účinností.

Přípravek neaplikujte přímo do nory.
NEBEZPEČNÝ PRO VOLNÉ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

Použití č. 1: Myš domácí – vnitřní prostory (odborníci)

Dávka: 40 g nástrahy na deratizační stanici (pomocí dávkovacího zařízení).

Rozestupy: Je-li zapotřebí více než jedno nástrahové místo, umístěte je ve vzdálenosti přibližně 5 metrů od sebe.

Kontrola: Stanice s nástrahou kontrolujte nejméně každé 2 až 3 dny na začátku deratizace a poté nejméně jednou týdně, aby se zjistilo, zda je nástraha přijímána, stanice jsou neporušené a případně odstraňte těla uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Specifické pokyny: Postupujte podle metodických pokynů Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace vydaných podle zákona č. 258/2000 Sb.

Použití č. 2: Potkan obecný a krysa obecná – vnitřní prostory (odborníci)

Dávka: 60–100 g nástrahy na deratizační stanici (pomocí dávkovacího zařízení).

Rozestupy: Je-li zapotřebí více než jedno nástrahové místo, umístěte je ve vzdálenosti přibližně 5 metrů od sebe.

Kontrola: Stanice s nástrahou kontrolujte nejméně každé 5 až 7 dní po zahájení deratizace a poté nejméně jednou týdně, aby se zjistilo, zda je nástraha přijímána, stanice jsou neporušené a případně odstraňte těla uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Specifické pokyny: Postupujte podle metodických pokynů Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace vydaných podle zákona č. 258/2000 Sb.

Použití č. 3: Myš domácí, potkan obecný, krysa obecná – venkovní prostory v okolí budov (odborníci)

Dávka: Myš domácí: 40 g nástrahy na deratizační stanici; Potkan obecný nebo krysa obecná: 60–100 g nástrahy na deratizační stanici (pomocí dávkovacího zařízení).

Rozestupy: Je-li zapotřebí více než jedno nástrahové místo, umístěte je ve vzdálenosti

přibližně 5 metrů od sebe.

Kontrola: Stanice s nástrahou kontrolujte (u myši – nejméně každé 2 až 3 dny; u potkanů a krys – nejdříve za 5 až 7 dní) na začátku deratizace a poté nejméně jednou týdně, aby se zjistilo, zda je nástraha přijímána, stanice jsou neporušené a případně odstraňte těla uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Specifické pokyny: Chraňte nástrahu před povětrnostními podmínkami (např. déšť, sníh atd.). Umístěte deratizační stanice na místa, kde nehrozí zaplavení.

Vyměňte nástrahu v deratizační stanici, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Neaplikujte tento přípravek přímo do nory. Postupujte podle metodických pokynů Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace vydaných podle zákona č. 258/2000 Sb.

Použití č. 4: Myš domácí, potkan obecný, krysa obecná – vnitřní prostory (vyškolení odborníci)

Dávka: Nízké zamoření: 40–60 g nástrahy na deratizační stanici nebo nástrahové místo; Vysoké zamoření: 60–100 g nástrahy na deratizační stanici nebo nástrahové místo (pomocí dávkovacího zařízení).

Rozestupy: Je-li zapotřebí více než jedno nástrahové místo, umístěte je ve vzdálenosti přibližně 5 metrů od sebe.

Kontrola: Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku. Pravidelně kontrolujte spotřebu nástrahy a obnovte ji, pokud je zcela nebo částečně zkonsumována, zničena nebo znečištěna.

Specifické pokyny: Postupujte podle metodických pokynů Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace vydaných podle zákona č. 258/2000 Sb.

Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou pulzní aplikace nástrahy.

Použití č. 5: Myš domácí, potkan obecný, krysa obecná – venkovní prostory v okolí budov (vyškolení odborníci)

Dávka: Nízké zamoření: 40–60 g nástrahy na deratizační stanici nebo nástrahové místo; Vysoké zamoření: 60–100 g nástrahy na deratizační stanici nebo nástrahové místo (pomocí dávkovacího zařízení).

Rozestupy: Je-li zapotřebí více než jedno nástrahové místo, umístěte je ve vzdálenosti přibližně 5 metrů od sebe.

Kontrola: Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku. Pravidelně kontrolujte spotřebu nástrahy a obnovte ji, pokud je zcela nebo částečně zkonsumována, zničena nebo znečištěna.

Specifické pokyny: Chraňte nástrahu před povětrnostními podmínkami (např. déšť, sníh atd.). Umístěte deratizační stanice na místa, kde nehrozí zaplavení.

Vyměňte nástrahu, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami. Při venkovním použití musí být nástrahová místa zakrytá a umístěná tak, aby se minimalizovala expozice necílových organismů.

Neaplikujte tento přípravek přímo do nory. Postupujte podle metodických pokynů Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace vydaných podle zákona č. 258/2000 Sb.

Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou pulzní aplikace nástrahy.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Přípravky skladujte v originálních obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem.

Skládejte na místech mimo dosah dětí, ptáků, domácích a hospodářských zvířat.

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců.

DALŠÍ INFORMACE

Hlodavci začínají hynout za 4–10 dní po konzumaci přípravku a k jejich vyhubení by mělo dojít do 35 dní.

Hlodavci mohou být přenašeči původců způsobujících onemocnění. Nedotýkejte se uhynulých hlodavců holými rukama, používejte rukavice nebo nástroje, jako jsou kleště apod., při jejich likvidaci.

Tento přípravek obsahuje hořkou látku a barvivo. Na konci deratizace zlikvidujte nespotebbovanou nástrahu i obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.