

250 mm

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Přípravek Permex 22 E naředíte vodou na 0,3 – 1% pracovní směs (tj.: 30 – 100 ml přípravku do 10 litrů vody) v závislosti na síle zamoření. Aplikujte postříkem na všechna místa a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr na 10 – 15 m². Proti komárům lze postříkat i na vegetaci v nich se přes den ukrývají v dávkách, při nichž nebude postřík z listů ošetřených rostlin odkapávat.

Přípravek Permex 22 E je možné naředit na 3% pracovní směs (tj. 300 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikovat ve formě studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 1 litr na 1 ha ve venkovním prostoru nebo ve formě horkého nebo studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 2 litru na každých 1000 m³ vnitřního prostoru. V objektech živočišné výroby je možné přípravek aplikovat jen bez přítomnosti zvířat.

PRVNÍ POMOC:

Informace pro lékaře:

Pharmakodynamika účinných látek: přerušují přenos nervových impulzů.
Terapie: Symptomatická.

- Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.
- Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.
- Při zasažení očí: Zasažené oko/ocí vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci není ochranný oděv a pomůcky nutné. V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575, e-mail: tis@vfn.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.



PERMEX 22E®

CHARAKTERISTIKA:

Insekticidní koncentrát ve vodní mikroemulzi určený k naředění vodou a k aplikaci postříkem proti škodlivému létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, pakomáři, vosy, zavíječi, tiplici a muchničky, a lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, mravenci, rybenky, brouci, blechy, apod. v bytech, školách, veřejných budovách, úřadech, rekreačních objektech, hotelích, ubytovacích zařízeních, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, průmyslových provozovnách, v objektech živočišné výroby, v objektech chovů zvířat, v prostředcích veřejné dopravy a pro hubení dospělých komárů v okolí obytných budov pod.

UPOZORNĚNÍ:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevedechněte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností a pracovních prostorů, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte k ochraně rostlin. Přípravek je možné prodávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.

MECHANISMUS ÚČINNOSTI:

Přípravek Permex 22 E obsahuje kombinaci dvou syntetických pyretroidů, permethrinu a tetramethrinu, synergizovaných piperonyl butoxidem, což zajišťuje jeho vysokou, rychlou a dlouhodobou reziduální účinnost. Přípravek účinkuje na hmyz kontaktně.

PERMEX 22 E®

UFI: Q5K8-Y0AK-600S-8F6P

Přípravek je určen k profesionálnímu použití

Bjocidní přípravek: insekticid, TP 18

Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje

Permethrin 92% cis/trans 25/75 12,36 g (127,3 g/l) (čistá látka 11,37 g)

Tetramethrin 1,64 g (16,9 g/l) (tech. 1,78 g)

Piperonyl butoxid 6,40 g (65,9 g/l) (tech. 6,81 g)

Ko-formulanty do 100 g

**OBSAHUJE: tetramethrin; benzensulfonová kyselina, C10-13-
sek.alkylderiváty, vápenaté soli; iso-butanol; permethrin**

OZNAČENÍ RIZIK: H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

NEBEZPEČÍ



PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P280 Používejte ochranné rukavice/EN374/ochranný oděv/ochranné brýle (EN166)/obličejový štít.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal na sběrných místech pro nebezpečný nebo speciální odpad.

OZNAMOVATEL: BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 Z.I. Villanova 47122 Forlì (FC) - Itálie - Tel. +39 0543 754430

DOVOZCE A DISTRIBUTOR V ČR: SLOM, s.r.o., U Tescomy 251, Lužkovice - 760 01 Zlín - Tel.: +420 774 736 855, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

Číslo povolení: MZDR 20415/2020/OBP

číslo šarže/datum výroby:

BALENÍ: 1L

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU: Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.

DOBA POUŽITELNOSTI: Spotřebujte do 4 roků od data výroby uvedeném na obalu.

140 mm

EX110003CZF